

## IMPLEMENTACIÓN TCS

La **distribución** de los difusores debe ser homogénea en toda la finca.

Los difusores **deben colocarse** antes del inicio de la floración y del primer vuelo de la plaga.

Es importante respetar la dosis indicada de **80 difusores por hectárea**.

■ difusor de feromona

**En la planta**, los difusores se colocan en el cargador o en el pitón, en la parte más alta posible, dado que la nube de feromona tiende a bajar por efectos de la gravedad. La nube de feromona es mucho más densa que el aire.

**Aumentar la cantidad** de difusores por hectárea no implica un mejor control, solamente acarrea un aumento de los costos.

**Colocar menos difusores** de los recomendados por hectárea, baja notablemente la efectividad de la técnica y el control.

# ISCAMEN

Programa  
de Erradicación de  
*Lobesia botrana*

## Guía para la instalación de Difusores de Feromonas


**ISCAMEN** Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza



Sede Central ISCAMEN: Boulogne Sur Mer 3050, Mendoza  
(0261) 4295450 / 4258741 / 4297315 / 4299013 / 4299015  
lobesia@iscamen.com.ar



**ISCAMEN**  
INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD  
AGROPECUARIA MENDOZA



**INSTALACIÓN DIFUSORES**

**Distancia entre hileras 1.8 m**  
 Los difusores deben colocarse **cada 7 hileras y cada 10 m** dentro de la hilera

**Distancia entre hileras 2 m**  
 Los difusores deben colocarse **cada 7 hileras y cada 9 m** dentro de la hilera

**Distancia entre hileras 2.2 m**  
 Los difusores deben colocarse **cada 6 hileras y cada 9.5 m** dentro de la hilera

**Distancia entre hileras 2.5 m**  
 Los difusores deben colocarse **cada 5 hileras y cada 10 m** dentro de la hilera

**Distancia entre hileras 3 m**  
 Los difusores deben colocarse **cada 6 hileras y cada 7 m** dentro de la hilera