

## INSTALACIÓN DIFUSORES

**Distancia entre hileras 1.8 m**  
-----  
Los difusores deben colocarse  
**cada 4 hileras y cada 5.5 m**  
dentro de la hilera

**Distancia entre hileras 2 m**  
-----  
Los difusores deben colocarse  
**cada 3 hileras y cada 7 m**  
dentro de la hilera

**Distancia entre hileras 2.2 m**  
-----  
Los difusores deben colocarse  
**cada 3 hileras y cada 6 m**  
dentro de la hilera

**Distancia entre hileras 2.5 m**  
-----  
Los difusores deben colocarse  
**cada 3 hileras y cada 5.3 m**  
dentro de la hilera

**Distancia entre hileras 3 m**  
-----  
Los difusores deben colocarse  
**cada 2 hileras y cada 6.6 m**  
dentro de la hilera


## IMPLEMENTACIÓN TCS

La distribución de los difusores debe ser homogénea en toda la finca.

Los difusores deben colocarse antes del inicio de la floración y del primer vuelo de la plaga.

Es importante respetar la dosis indicada de 350 difusores por hectárea.

difusor de  
feromona



En la planta, los difusores se colocan en el cargador o en el pitón, en la parte más alta posible, dado que la nube de feromona tiende a bajar por efectos de la gravedad. La nube de feromona es mucho más densa que el aire.

Aumentar la cantidad de difusores por hectárea no implica un mejor control, solamente acarrea un aumento de los costos. Colocar menos difusores de los recomendados por hectárea, baja notablemente la efectividad de la técnica y el control.

# ISCAMEN

Sede Central ISCAMEN / Boulogne Sur Mer 3050, Mendoza /  
(0261) 4295450 / 4258741 / 4297315 / 4299013 / 4299015 /  
lobesia@iscamen.com.ar



www.iscamen.com.ar

# ISCAMEN

Programa  
de Erradicación de  
*Lobesia botrana*

## Guía para la instalación de Difusores de Feromonas



MENDOZA GOBIERNO



ISCAMEN  
INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD  
AGROPECUARIA MENDOZA