

Arañuelas

Fenología	Estado	Lugar	Anotación	N° pl/ ha	Observaciones	U.D.E.
REPOSO INVERNAL	Huevos rojos	Base de dardos y ramitas.	% dardos ocupados	15	7dardos/pl	3-10% presencia
		Polvillo		20	4dardos/pl	
YEMA HINCHADA						
FLORACION	Ninfas recién nacidas	Dardos y 1ras hojas	% dardos ocupados	15	dardos	Verificar eficiencia de tratamiento invernal
CAIDA DE PETALOS	Ninfas y adultos	Hojas cercanas a dardos	% hojas ocupados	15	100 hojas	45% hojas con presencia
				20	5 x planta	
FRUTO CUAJADO	Ninfas y adultos	Hojas cercanas a dardos	% hojas ocupados	15	100 hojas	45% hojas con presencia
				20	5 x plantas	
DICIEMBRE	Ninfas y adultos	Hojas del sector medio de los brotes del año	% hojas ocupados	15	100 hojas x 5 plantas	65% hojas con presencia
				20		
ENERO COSECHA POSTCOSECHA	Ninfas y adultos	Hojas del sector medio de los brotes del año	% hojas ocupados	15	100 hojas x 5 plantas	65% hojas con presencia
				20		